bioenzymas

FICHA TECNICA

CABAL PLUS®

LÍQUIDO

GARANTIA DE COMPOSICION **% EN PESO**

GARANTIA DE COMPOSICION	% EN PESO	GARANTIA DE COMPOSICION	% EN PESO
Nitrógeno total (N)	10.028	Magnesio (Mg)	0.027
Fósforo $P_2 O_5$	20.106	Manganeso (Mn)	0.043
Potasio (K_2O)	5.089	Molibdeno (Mo)	0.006
Azufre (S)	3.705	Zinc (Zn)	0.057
Boro (B)	0.052	Acido Húmico	0.514
Calcio (Ca)	0.038	Acido Fúlvico	0.451
Cobre (Cu)	0.051	Folcisteina	0.389
Cobalto (Co)	0.003	Acido indolacetico	0.004
Fierro(Fe)	0.062	Acondicionadores y diluyentes	59.375
		TOTAL	**100.00**

Registro: RSCO-0093/VI/00

Puede ser nocivo en caso de ingestión

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN
UTILÍCESE EN LOS CULTIVOS Y A LAS DOSIS AQUÍ RECOMENDADAS

CABAL PLUS® es un regulador de crecimiento líquido que contiene Auxinas, Folcisteina, NPK más elementos secundarios y micro elementos, complementado con Ácidos Húmicos y Fúlvicos. Esta formulación apoya en la germinación, el desarrollo radicular y vegetativo la floración, promueven la división celular, incrementan la tolerancia al estrés principalmente. Para utilizarse en aplicaciones al follaje así como al suelo en fertirriego, siguiendo un programa de nutrición balanceado.

Aplicación foliar:

CULTIVOS	DOSIS L/Ha	OBSERVACIONES
Ajo, cebolla	2-3	Aplicar cada 15 días, a partir del estado de 6 hojas verdaderas
Alfalfa, trébol, pastos	2-3	Al inicio del desarrollo vegetativo o una semana después del corte.
Cereales	1.5-2	Al inicio del amacollamiento y encañe
Hortalizas de flor, tallos u hojas	2-3	Una semana después del la emergencia o trasplante, aplicar cada quince días. Máximo 4 aplicaciones en el ciclo.
Frutales	400-600 cc (por cada 100 L de agua)	Aplicar al inicio del floración y al amarre de frutos
Jícama, Papa,	2-3	Veinte días después de la emergencia, repetir cada 15 días. Máximo 4 aplicaciones

Aplicación en fertirriego:

CULTIVOS	DOSIS L/Ha	OBSERVACIONES
Hortalizas	20-40	Aplicar al trasplante, dosis baja durante la etapa de floración. Repetir a los 21 días.
Frutales	40	Iniciar aplicación antes de la floración y al inicio de amarre de frutos.
Gramíneas	10-20	Iniciar aplicaciones una semana después de la siembra, repetir cada 15 días según necesidades.

FORMAS DE PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

En un recipiente realice una pre mezcla de **CABAL PLUS®** agitando levemente, posteriormente vacíe la pre mezcla en el tanque del equipo aspersor y complete después la cantidad de agua necesaria.
En aplicaciones al suelo, incluir **CABAL PLUS®** en el programa de fertirriego, tomando como base el análisis de suelo, para ajustar el número de aplicaciones necesarias por ciclo del cultivo.

COMPATIBILIDAD:
CABAL PLUS® es compatible con la mayoría de los fertilizantes y plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de usarse.
CABAL PLUS® no se recomienda mezclarlo con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:
CABAL PLUS® no es fitotóxico, aplicado en los cultivos indicados y a las dosis recomendadas en su etiqueta.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
Observe estas advertencias de seguridad:

1. NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
2. NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA.
3. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
4. LÁVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
5. NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.

EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MEDICO.

Formulado por:
NAY-CHEM, S.A. de C.V.
CARRETERA INTERNACIONAL No. 15, Km 137,
CORREDOR INDUSTRIAL LOTES: 10 y 11, 63400,
ACAPONETA, NAYARIT. TELS: (325) 252 1348 y (311) 212 6672

Ficha técnica Cabal Plus, rev. enero 2017. Versión 2